



请不要忘记给孩子打预防针!

~为了预防孩子患上感染症~

孩子从母体得到的免疫能力,出生后6个月左右就会自然消失。然而随着孩子年龄的增长,在户外活动机会也越来越多,也就更容易患上感染症。尤其是患上感染症时容易引发严重的合并症,甚至会有生命危险。接种预防疫苗,能够让孩子自身产生免疫力,从而起到预防疾病的目的。

~在进行预防接种之前~

■ 市政府对预防接种不做个别通知。

请根据孩子的年龄及身体状况事先作好计划,在市内接种实施医院(详见一览表)接种。

■ 有关预防接种的说明书『予防接種と子どもの健康』及各种予诊票,市里在实施新生儿家庭访问时有配发。另外,在こども家庭課、各支所、实施预防接种的各医院也能领取到。

请一定在详细阅读说明书,确认效果、副作用及注意事项后再进行接种。

需携带物品:

- 母子健康手册
- 予诊票



患上感染症之后的预防接种该怎么办?


患上麻疹、水痘、突发性发疹等感染症,或者是发生痉挛时,需要间隔一定期间之后再进行接种。必要时会需要医生的接种许可。请务必向经常就诊的医生咨询。

在东广岛市以外的地区也可以接种吗?


在东广岛市住民登录的人,原则上在东广岛市内进行接种。但是,由于种种原因希望在外接种者,需要事先办理必要的手续。请向以下部门咨询。
※在在外接种时,有可能需要自负接种费用。

【进行预防接种之后,到下一次的接种需要间隔多长时间?】(标准接种时)

① 接种不同类型的疫苗时



② 接种同类的疫苗时



【咨询处】 東広島市 こども家庭課 母子保健係 星期一至星期五 8:30~17:15

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 TEL (082) 420-0407 • FAX (082) 424-1678

黒瀬支所 福祉保健課 0823-82-0220 豊栄支所 地域振興課 082-432-2563

河内支所 地域振興課 082-437-1109 安芸津支所 福祉保健課 0846-45-2065

定期预防接种(接种对象年龄内的话可免费进行接种)

原则上推荐接种的疫苗。

法律上规定了接种的种类、对象以及接种期间。考虑到孩子容易患病的时期，请尽量在「建议接种期」内进行接种。

预防接种名	接种对象年龄	建议接种期	接种开始年龄	接种次数	接种间隔
Hib 疫苗	2 个月 ~5 岁未 满 ※根据接种开始时的年龄不同，接种的次数也有所不同。	2~7 个月	2~7 个月未 满 (标准接种年龄)	初期 3 次 加强 1 次	每次间隔 27 天以上，标准间隔 27 至 56 天。 初期 3 次接种完、间隔 7 个月以上。 标准间隔为 7 至 13 个月。
			7~12 个月未 满	初期 2 次 加强 1 次	每次间隔 27 天以上，标准间隔 27 至 56 天。 初期 2 次接种完、间隔 7 个月以上。 标准间隔 7 至 13 个月。
			12 个月~5 岁未 满	1 次	—
※2 至 12 个月之间开始接种，如果在满 12 个月之前不能完成初期接种时，将不再进行剩余次数的初期接种。最后的初期接种后，间隔 27 天以上可以注射加强针。					
小儿用肺炎球菌疫苗	2 个月 ~5 岁未 满 ※根据接种开始时的年龄不同，接种的次数也有所不同。	2~7 个月	2~7 个月未 满 (标准接种年龄)	初期 3 次 加强 1 次	每次间隔 27 天以上。 初期 3 次接种完、间隔 60 天以上(满 12 个月之后)。
			7~12 个月未 满	初期 2 次 加强 1 次	标准为截至生后 13 个月，间隔 27 天以上。 初期 2 次接种完、间隔 60 天以上(满 12 个月之后)。
			12 个月~2 岁未 满	2 次	间隔 60 天以上。
			2~5 岁未 满	1 次	—
※2 至 7 个月之间开始接种，如果在满 24 个月之前不能完成初期接种时，将不再进行剩余次数的初期接种。另外，如果初期第 2 次接种时月龄已超过 12 个月时，请不要再注射第 3 次。加强针可能。					
※7 至 12 个月之间开始接种，如果在满 24 个月之前不能完成初期接种时，将不再进行剩余次数的初期接种。加强针可能。					

预防接种名	接种对象年龄		建议接种期	接种次数	相同接种间隔时间	备考
乙肝	2~12 个月未 满		2~9 个月未 满	2 次 1 次	间隔 27 天以上 第 1 次接种后间隔 139 天以上	※H B s 抗原阳性的母亲生下的，已接种全部或一部分的乙肝疫苗(同时注射乙肝免疫球蛋白)的婴儿为对象外。
白喉(D) 百日咳(P) 破伤风(T) 小儿麻痹(IPV) (四联疫苗) DPT-IPV	第 1 阶段 初期接种	生后 3 个月至 7 岁 6 个月未 满	3~12 个月	3 次	20 天以上 标准间隔 20 至 56 天	以前接种过三联疫苗者，剩余次数的接种将变更为四联疫苗。
	第 1 阶段 加强	生后 3 个月至 7 岁 6 个月未 满	初期 3 次接种后，间隔 12 至 18 个月(初期 3 次接种后，间隔 6 个月以上)	1 次	—	
	第 2 阶段 [2 种混合(DT)]	11~13 岁未 满	11 岁	1 次	—	第 2 阶段注射白喉·破伤风二联疫苗。
小儿麻痹(单独)疫苗的接种对象年龄、建议接种期间、接种次数与 DPT-IPV 相同。						
BCG 卡介苗	1 岁未 满		5~8 个月未 满	1 次	—	可预防结核。
麻疹(M) 风疹(R) (MR)	第 1 阶段	12~24 个月未 满	12~ 24 个月未 满	1 次	—	满 1 周岁后请尽早接种。
	第 2 阶段	5~7 岁未 满 小学入学前 1 年者	小学入学前 1 年 (4 月 1 日~3 月 31 日)	1 次	—	春夏季比较容易流行，请尽早接种。
※原则上第 1 阶段和第 2 阶段均为麻疹·风疹二联疫苗的接种。						
水痘	第一次	1~3 岁未 满	1 岁至 1 岁 3 个月未 满	1 次	3 个月以上	满 1 周岁后请尽早接种。
	第二次		第 1 次接种后，间隔 6 个月至 1 年	1 次		
乙型脑炎	第 1 阶段 初期接种	生后 6 个月至 7 岁 6 个月未 满	3 岁	2 次	6 天以上 标准间隔 6~28 天	※注 1 左记的年龄以外、如果错过了接种机会的话，可以在 20 周岁之前(※特例对象者)，把不够的接种次数补上。
	第 1 阶段 加强	生后 6 个月至 7 岁 6 个月未 满	4 岁 (第 1 阶段初期接种完后，间隔 6 个月以上，标准间隔为 1 年左右)	1 次	—	
	第 2 阶段	9~13 岁未 满	9 岁 (第 1 阶段的加强针注射完之后，大约间隔 5 年后)	1 次	—	

※注 1 ※特例对象者 是指

- 2007 年 4 月 2 日至 2009 年 10 月 1 日出生者，只限第 2 阶段(9 至 13 岁)的期间内，可以接种第 1 阶段的剩余次数。
- 1997 年 4 月 2 日至 2007 年 4 月 1 日出生者，可在年满 20 周岁之前，接种 4 次中的剩余次数。

现在不积极推荐此项接种

子宫颈癌疫苗	小学 6 年级至高 中 1 年级女生	中学 1 年级女生	共需接种 3 次 (标准接种方法: 第 1 次接种后间隔 1 个月或 2 个月后进行第 2 次接种、第 3 次接种为第 1 次接种后间隔 6 个月)
※如果不能按标准日程接种 2 价疫苗时，间隔一个月以上接受了两次接种后，第 3 次接种需要在第 1 次接种后间隔 5 个月以上，并且第 2 次接种后间隔 2 个半月以上。即便接种了此疫苗，20 周岁后也需要定期接受检查。			

■由于法律的改定等，预防接种的接种时期或接种方法会有变更。届时会在月刊东广岛上随时通知。

■此外，收费的任意预防接种包括有：流行性腮腺炎、流感、轮状病毒等。

※希望接种者请直接向各实施医院咨询。

平成 29 年 3 月作成
平成 29 年 8 月改

